

こんなこともできる

矯正治療

NLT矯正研究所

はじめに

矯正治療は歯並びをきれいにし、歯の過重負担を軽減し歯を長持ちさせます。特に、抜かなければならないと諦めていた歯を、矯正治療により残せることもあります。このパンフレットが、歯を残す治療を知るキッカケとなることを願って止みません。

目次

１．奥歯が倒れていると諦めてはいませんか。

２．下顎智歯が残っていると良いこともある。

３．下顎の奥歯が生えてこない。　・・・①

４．下顎の奥歯が生えてこない。　・・・②

５．上顎の前歯の歯根が吸収している。

６．上顎の前歯が上向きに生えている。

７．下顎の奥歯の向きがおかしい。

８．下顎の奥歯の病気を治したい。

９．下顎智歯の病気を治したい。

10．小臼歯抜歯治療のベネフィット

1．奥歯が倒れていると諦めてはいませんか。





初診時(54 歳)

奥歯の直立中



奥歯を直立（26 ヵ月後）

２．下顎智歯が残っていると良いこともある。



初診時（60 歳）

手前の歯を抜去、智歯の直立開



智歯を配列・保存（13 ヵ月後）

３．下顎の奥歯が生えてこない。　・・・①

初診時（10歳）

嚢胞による萌出障害



レントゲン写真

開窓・嚢胞消失



開窓・萌出誘導

萌出誘導中





終了時（６ヵ月後）

4．下顎の奥歯が生えてこない。　・・・②





初診時（9歳）

嚢胞による萌出障害

レントゲン（CBCT）

開窓・直立



嚢胞消失

直立中





終了時（９ヵ月後）

５．上顎の前歯の歯根が吸収している。



初診時（14 歳）

歯根吸収



レントゲン写真とＣＴ

歯根吸収停止



萌出誘導中

直立終了





直立時（11ヵ月後）

６．上の前歯が逆向きに生えている。

初診時（7歳）





開窓・アップライト

歯根形成中（14ヵ月後）





歯根を曲げずに形成（11歳）

7．下顎の奥歯がでてこない（方向異常）。

初診時（12 歳）



開窓・アップライト

歯根形成中



終了時（８ヵ月後）

８．下顎の奥歯がでてこない（嚢胞）。

初診時（11 歳）・嚢胞による萌出障害



開窓・萌出誘導・嚢胞消失

歯根形成中





終了時（11 ヵ月後）

９．下顎智歯の病気を治したい。

初診時（26 歳）



嚢胞が歯を押している

手前の歯を抜去、智歯の誘導



嚢胞消失・萌出誘導（下：６ヵ月）

１０−１．小臼歯抜歯治療のベネフィット

初診時

側面



終了時

ベネフィット１：綺麗な歯並び

１０−２．ベネフィット２：　顔貌の変化

側貌（左治療前・右治療後）

上下唇はE-line まで後退

正貌



オトガイ筋の緊張消失

口呼吸は扁桃腺炎を発生することもある。

１０−３．ベネフィット３：智歯の保存

初診時



小臼歯抜歯治療

上下顎両側智歯の保存

１０−４．下顎智歯の直立治療

初診時

小臼歯抜去

直立開始

終了時

下顎智歯抜去の外科的侵襲を回避する。

非売品



著者　野田隆夫
2023年3月13日　第3版発行
〒196-0033 東京都昭島市東町1-16-38
tel 042-540-0966